Brain Club

Session du 19/10/2023

Lara Mauro, Dr Albert Themelin, Dr Stéphane Chanalet, Dr Lydiane Mondot

Service d'Imagerie Médicale

CHU de Nice – Pasteur 2

Mme R.

- **Patiente de 74 ans**

- **Absence d'antécédent particulier**
- Pas de prise de traitement médicamenteux
- Pas de prise d'alcool ou de toxique rapportée
- Mode de vie : secrétaire médicale à la retraite, vit seule

- **Anamnèse**

- En mars 2023
- **Troubles du langage**
A type d'aphasie de Broca
- D'apparition brutale
- Spontanément régressifs

Glycémie capillaire : 1,53 g/L

Mme R.

- Angioscanner des troncs supra-aortiques

Pas d'occlusion ou de sténose des artères
à destinée encéphalique

Mme R.

- IRM initiale de mars 2023

Plage
en hypersignal diffusion
pariéto-occipitale

Restriction
du coefficient ADC

Plage
en hypersignal FLAIR

Pas
d'anomalie
/ T2*

Prises de contraste
patchy

Quels diagnostics évoquez-vous ?

Mme R.

- **EEG**

- Initial de mars

Foyer postérieur gauche de potentiels épileptiformes pseudopériodiques

sans épisode critique organisé

- **Evolution clinique**

- En juillet 2023

- **Apparition d'une HLH droite**

- **Apraxie**

- **Syndrome confusionnel**

- Cohérence des propos et attention fluctuantes

- Pas de trouble phasique résiduel

Mme R.

Modification de la topographie lésionnelle

- IRM de juillet 2023

IRM initiale

Mme R.

- **EEG**

- Contrôles de juillet / août

Persistence d'activités paroxystiques

pseudopériodiques continues hémisphériques

gauches à **prédominance temporo-pariétale**

cédant partiellement au Rivotril I.V.

- **Bilan biologique**

- Dysglobulinémie biconale IgA / IgM kappa

- **TAP**

- Hétérogénéité diffuse de la trame osseuse

- **TEP - TDM**

- Hypermétabolisme / lésion pariéto-occipitale

- **Ponction lombaire**

- Eau de roche

- Élément : 0/mm³ ; Hématies : 0/mm³

- ED : absence de germe ; Cultures : négatives

- **Protéïnorachie : 0,49 g/L**

- Glycorachie : 3,83 mmol/L

- Taux de lactates : 1,90 mmol/L (N)

- LDH : 35 U/l (N)

- Profil oligoclonal (2 bandes)

- **Index IgG de Link : 1,12 (↑)**

- **IL 10 : 83,4 pg/mL (↑) ; IL 2 : 254 pg/mL (↑)**

- **Rapport B2-microglobuline LCR/sérum : 3,2 (↑)**

Décision de biopsie chirurgicale

Mme R.

Poursuite de la modification de la topographie lésionnelle

- IRM pré-biopsie

Prise en charge

- **Chirurgicale**

- Biopsie chirurgicale en septembre 2023

- Infiltrat de cellules lymphoïdes de grande taille
- Volumineux noyaux vésiculeux avec nucléole proéminent
- CD 20 +, CD 5 +, Ki67 : 90%

Lymphome diffus B à grandes cellules

- **Chimiothérapie**

- **Méthotrexate** à forte doses

Les lésions post - ictales

Aspects en imagerie du Status Epilepticus

Status Epilepticus

- Aspects typiques en imagerie

ADC
variable

Hypersignal diffusion
cortical

Hypersignal T2
cortical / œdème

Hypersignal diffusion / FLAIR
/ splénium du corps calleux

Hypersignal diffusion
/ pulvinar

Hypersignal diffusion
et T2 / hippocampe

Diaschisis
cérébelleux croisé

Hyperperfusion

Evolution

- Régression complète en quelques jours à semaines
- OU évolution vers l'atrophie corticale à distance

Les lymphomes primitifs cérébraux

Aspects en imagerie et atypies

Aspects typiques

90 % : Localisations supra-tentorielles

2^e tumeur la + fréquente du SNC
7 % des tumeurs primitives du SNC
98 % = LMNH à grandes cellules de type B

Atteinte NGC

Hyperdensité spontanée
- PDC homogène

Hypersignal diffusion /
restriction ADC

Réhaussement intense
« en plage »

Atteinte péri-épendymaire

Hyposignal T2

DSC PWI
rVSC bas
PSR ↑ / Rupture BHE

Atteinte du corps calleux

Aspects atypiques

ATYPIES	
<u>Aspect</u>	Lésion infiltrante
	Nécrose ou hémorragie / PDC en anneau (Immunodéprimé)
	Absence de PDC (Corticoides)
	Forme pseudo-inflammatoire
<u>Localisation</u>	Infratentorielle
	Axe hypothalamo-hypophysaire
	Région pinéale
	Extra-cérébral (médullaire, sinus caverneux, osseux)
	Forme leptoméningée
	Forme intravasculaire

Forme endovasculaire

Forme infiltrante Capsulo-thalamique

BIOPSIE

Take Home Messages

Red flags

❑ Clinique / EEG

- Persistance d'anomalies EEG > lésion sous-jacente ?
- Absence d'antécédents de pathologie épileptique

❑ Evolution en IRM

- Aspect migrateur des lésions
- Atteinte de la SB / PDC *patchy*
- Caractère hyperperfusé persistant

❑ Ponction lombaire

- Augmentation IL 10
- Augmentation B2-microglobuline

Lymphomes

Tableaux polymorphes

Lésions non réhaussées

Références

Matano S et al. Primary leptomeningeal lymphoma. J Neurooncol. 2001 Mar ; 52(1):81-3.

doi: 10.1023/a:1010628924066. PMID: 11451206.

Prayson RA et al. Intravascular lymphoma mimicking vasculitis. J Clin Neurosci. 2016 Dec ; 34:224-225.

doi: 10.1016/j.jocn.2016.06.010. Epub 2016 Jul 26. PMID: 27469408.

P. Dérot et al. Service de Neuroradiologie – CHRU Nancy. Imagerie du Status Epilepticus.

Di Muzio B et al. Intravascular lymphoma. Reference article, Radiopaedia.org <https://doi.org/10.53347/rID-36986>

Carsin-Nicol B. Lymphomes du SNC. Service de Radiologie et d'Imagerie Médicale – CHU de Rennes. 2018.

Ota Y. Primary Central Nervous System Lymphoma: Essentials of Imaging Findings. Brain Nerve. 2021

Oct;73(10):1079-1086. Japanese. doi: 10.11477/mf.1416201897. PMID: 34615745.

Schaff LR, Grommes C. Primary central nervous system lymphoma. Blood. 2022 Sep 1;140(9):971-979.

doi: 10.1182/blood.2020008377. PMID: 34699590; PMCID: PMC9437714.

Lin X, Khan IRA, Seet YHC, Lee HY, Yu WY. Atypical radiological findings of primary central nervous system lymphoma.

Neuroradiology. 2020 Jun;62(6):669-676. doi: 10.1007/s00234-020-02377-0. Epub 2020 Feb 20.

Gaillard F et al. Intravascular CNS lymphoma. Case study, Radiopaedia.org [.https://doi.org/10.53347/rID-37944](https://doi.org/10.53347/rID-37944)

Han Y, et al. Differentiation Between Primary Central Nervous System Lymphoma and Atypical Glioblastoma

Based on MRI Morphological Feature and Signal Intensity Ratio: A Retrospective Multicenter Study.

Front Oncol. 2022 Jan 31;12:811197. doi: 10.3389/fonc.2022.811197. PMID: 35174088; PMCID: PMC8841723.

Merci pour votre attention